



## Pommade anti-callosités Vaseline salicylée 10 %

Principe actif : acide salicylique  
Pour adultes et adolescents à partir de 12 ans

### Notice d'emploi : Informations destinées à l'utilisateur

**Avant de commencer à prendre ce médicament, veuillez lire avec attention l'intégralité de la notice d'emploi qui contient des informations importantes sur l'utilisation de ce médicament.**

Prenez ce médicament toujours conformément aux descriptions de cette notice d'emploi ou exactement selon les indications de votre médecin, de votre pharmacien ou d'une personne exerçant une profession médicale qualifiée.

- Conservez cette notice d'emploi. Vous voudrez peut-être la consulter ultérieurement.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour de plus amples informations ou conseils.
- Si vous constatez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien ou une personne exerçant une profession médicale qualifiée. Ceci vaut également pour les effets secondaires qui ne sont pas indiqués dans cette notice. Voir point 4.
- Si au bout de 7 jours votre état ne s'est pas amélioré ou même s'il a empiré, veuillez consulter votre médecin.

### Ce qui est mentionné dans cette notice

1. Qu'est-ce que la Pommade anti-callosités à la vaseline salicylée 10 % et dans quels cas est-elle appliquée ?
2. Quelles précautions devez-vous prendre avant d'appliquer la Pommade anti-callosités à la vaseline salicylée 10 % ?
3. Comment appliquer la Pommade anti-callosités à la vaseline salicylée 10 % ?
4. Quels effets secondaires peuvent intervenir éventuellement ?
5. Comment conserver la Pommade anti-callosités à la vaseline salicylée 10 % ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

### 1. Qu'est-ce que la Pommade anti-callosités à la vaseline salicylée 10 % et dans quels cas est-elle appliquée ?

**Domaines d'utilisation :** Augmentation de la couche cornée (hyperkératose), cors (clavus), callosités (callus).

### 2. Quelles précautions devez-vous prendre avant d'appliquer la Pommade anti-callosités à la vaseline salicylée 10 % ?

**Ne pas appliquer la Pommade anti-callosités à la vaseline salicylée 10 % :**

- si vous êtes allergique à l'acide salicylique ou à un autre des composants de ce médicament mentionnés au point 6,
- en cas d'hypersensibilité de contact,
- chez les nourrissons,
- en cas de fonction rénale réduite.

### Avertissements et consignes de sécurité

La Pommade anti-callosités à la vaseline salicylée 10 % ne doit pas entrer en contact avec les muqueuses et les yeux.

### Lorsque vous appliquez la Pommade anti-callosités à la vaseline salicylée 10 % en même temps que d'autres médicaments

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien lorsque vous prenez, ou avez pris récemment, ou que vous avez l'intention de prendre d'autres médicaments.

L'acide salicylique peut renforcer l'absorption d'autres médicaments appliqués au même endroit. L'acide salicylique assimilé par le corps retarde l'élimination du méthotrexate et renforce l'effet des sulfonylurées.

### Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez ou si vous supposez être enceinte ou que vous avez l'intention de tomber enceinte, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Ne pas appliquer pendant la grossesse. Ne pas appliquer sur la poitrine pendant l'allaitement. Pour le traitement des cors, n'appliquer le produit que sur des surfaces inférieures à 5 cm<sup>2</sup>.



### 3. Comment appliquer la Pommade anti-callosités à la vaseline salicylée 10 % ?

Prenez toujours ce médicament conformément aux descriptions de cette notice d'emploi ou exactement selon les prescriptions de votre médecin ou de votre pharmacien ou d'une personne exerçant une profession médicale qualifiée. Veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien ou une personne exerçant une profession médicale qualifiée en cas de doute.

**La dose recommandée est la suivante :** Appliquer sur la peau 1-2 x par jour.

Dose journalière maximale pour les adultes : moins de 20 g (moins de 2 g de substance active).

Dose journalière maximale pour les adolescents à partir de 12 ans. : 2 g maximum (moins de 0,2 g de substance active).

**Mode d'administration :** Application cutanée.

**Durée de l'administration :** Ne pas appliquer pendant plus d'une semaine.

Pour de plus amples informations concernant la prise de ce médicament, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien ou à une personne exerçant une profession médicale qualifiée.

### 4. Quels effets secondaires peuvent intervenir éventuellement ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut lui aussi avoir des effets secondaires qui ne surviennent cependant pas dans tous les cas.

Des irritations de la peau peuvent se produire aux endroits où la Pommade anti-callosités a été appliquée.

Dans certains cas très rares, une allergie (allergie de contact) à l'acide salicylique inconnue auparavant peut se déclarer.

#### Signalement d'effets secondaires

Si vous constatez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien ou une personne exerçant une profession médicale qualifiée. Ceci vaut également pour les effets secondaires qui ne sont pas indiqués dans cette notice. Vous pouvez aussi signaler des effets secondaires directement à l'Institut fédéral allemand des médicaments et des dispositifs médicaux (BFARM), service pharmacovigilance, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, site web : [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de). En signalant les effets secondaires, vous contribuez à fournir plus d'informations relatives à la sécurité d'administration de ce médicament.

### 5. Comment conserver la Pommade anti-callosités à la vaseline salicylée 10 % ?

Conserver ce médicament hors de portée des enfants.

N'appliquez plus ce médicament au-delà de la date de péremption «utilisable jusqu'au» indiquée sur l'emballage. La date de péremption fait référence au dernier jour du mois mentionné.

**Conditions de conservation :** Ne pas conserver à plus de 25°C.

Ne jamais éliminer ce médicament avec les eaux usées (toilettes, évier). Demandez à votre pharmacien comment éliminer ce médicament si vous n'en avez plus besoin. Cette mesure contribue à protéger l'environnement. Vous trouverez plus d'informations sur [www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung](http://www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung).

### 6. Contenu de l'emballage et autres informations

**1 g de pommade contient : Principe actif :** 0,1 g d'acide salicylique.

**Autres composants :** paraffine fluide, vaseline blanche.

**Taille d'emballage disponible :** La Pommade anti-callosités à la vaseline salicylée 10 % est disponible en emballage original de 90 g.

**Cette notice d'emploi a été révisée pour la dernière fois en juillet 2021.**

PB0222

Article n° 894

Veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien ou consulter cette notice d'emploi pour connaître les risques et les effets secondaires.